

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

CLARIMIR SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,012 % (Nafazolina clorhidrato)

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICION:

Cada mL de solución oftálmica contiene:

Nafazolina clorhidrato 0,12 mg

Excipientes: Edetato disódico, cloruro de sodio, cloruro de benzalconio, agua purificada , c.s.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oftálmica exclusivamente

CLASIFICACION TERAPÉUTICA:

Grupo terapéutico: Simpaticomiméticos utilizados como descongestionante.
Código ATC: S01GA01.

INDICACIONES:

Elimina el rojo del ojo.

Indicado para el alivio de las irritaciones conjuntivales, hiperemias de orígenes diversos, ardor, prurito y otras irritaciones oculares causadas por el polvo, smog, viento, natación, humo, lentes de contacto, excesiva exposición solar y todas aquellas debidas al cansancio ocular exceso de lectura, conducción nocturna, televisión, etc.

CONTRAINDICACIONES:

No usar en persona con hipersensibilidad a la Nafazolina o a alguno de los componentes de la formulación.

No administrar a personas con glaucoma de ángulo estrecho.

No administrar a niños menores de 2 años.

No se debe utilizar este producto si existe alguna infección de los ojos, cuerpos extraños u otras alteraciones.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Antes de usar este medicamento, lea las instrucciones.

Para mayor seguridad de uso de este producto, consulte al médico o químico farmacéutico más cercano.

Si la irritación ocular persiste después de administrar las gotas durante 4 días, debe suspender su uso y consultar al oftalmólogo.

Este medicamento no debe administrarse por más de 4 días seguidos a menos que lo indique el oftalmólogo.

Este preparado es sólo para uso oftálmico.
No utilizar la solución si se pone opaca o cambia de color.
No tocar el gotario con ninguna superficie, para prevenir la contaminación.

INTERACCIONES:

Si se encuentra en tratamiento con algún medicamento, consulte primero al médico o farmacéutico la posibilidad de utilizar este producto.

PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES:

En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al médico antes de aplicarse este producto, especialmente si tiene alguna patología ocular.

EFFECTOS ADVERSOS:

Ocasionalmente puede producirse enrojecimiento, irritación y aumento de la presión intraocular, en estos casos se debe suspender el uso y consultar al oftalmólogo.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN:

La vía de administración es exclusivamente ocular.
Instilar 1-2 gotas en el saco conjuntival, 2 a 3 veces al día ó según indicación médica.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en su envase original, en un lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

Fabricado por:

LABORATORIOS GRIN, S.A. de C.V., Rodriguez Saro No.630, Col. Del Valle,
C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México, México.

Importado y distribuido por:

LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., Avenida Quilín 5273, Peñalolén,
Santiago, Chile.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No recomende este medicamento a otra persona.