

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

FLAPEX ® E Cápsulas

Vía oral

Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente, si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte al farmacéutico.

Composición

Cada cápsula contiene : Simeticona (60 mg), Pancreatina (100 mg), Pepsina (50 mg), , Bilis de buey purificada (25 mg).

Excipientes: c.s.

Clasificación

Antiflatulento – Digestivo.

Recomendaciones de uso

Alivio sintomático de trastornos digestivos caracterizados por retención de gases en el estómago y/o intestinos.

Contraindicaciones

No administrar este medicamento en casos de: obstrucción biliar, cálculos biliares, dolor abdominal, vómitos, fiebre o diarrea.

No administrar este medicamento en caso de: inflamación gastro-duodenal, apendicitis, úlcera gastroduodenal activa.

Advertencias y/o Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No recomiende este medicamento a otra persona.

Este producto no debe ser usado por más de 7 días, si no ceden los síntomas consultar a su médico.

Este producto contiene azúcar. Precaución en diabéticos.

Efectos adversos

Puede presentarse erupción de la piel, lo que indicaría una reacción de tipo alérgica al medicamento. También puede presentar molestias gástricas.

Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

Interacciones

El efecto de este medicamento puede modificarse por la administración junto con otros (interacciones). Es muy importante que consulte con el Químico Farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento si está tomando otro, especialmente si se trata de: medicamentos que inhiban la secreción de jugo gástrico ejemplo: Cimetidina, Ranitidina, antiácidos, pueden aumentar el efecto de Pancreatina.

Modo de uso

1 a 2 cápsulas después de las comidas principales.

Condiciones de almacenamiento

Mantener en su envase original, protegido de la humedad a no más de 30°C.