

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
FLAPEX SUSPENSIÓN ORAL PARA GOTAS 4%**

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- **Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.**
- **Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.**
- **Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.**
- **Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.**

Contenido del prospecto:

1. ¿Qué es Flapex Suspensión oral para gotas 4% y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar Flapex Suspensión oral para gotas 4%?
3. ¿Cómo tomar Flapex Suspensión oral para gotas 4%?
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Flapex Suspensión oral para gotas [4%](#)
6. Contenido del envase e información adicional

1. ¿QUÉ ES FLAPEX SUSPENSIÓN ORAL PARA GOTAS 4% Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Flapex Suspensión oral para gotas pertenece al grupo de medicamentos que actúan en el intestino destruyendo las burbujas de gas, facilitando su eliminación y aliviando las molestias que ocasionan.

Está indicado para el Alivio de síntomas dolorosos por exceso de gas en el tracto digestivo (como estómago e intestinos).

2. ¿QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR FLAPEX SUSPENSIÓN ORAL PARA GOTAS?

No utilice Flapex Suspensión oral para gotas :

- Si es alérgico a la simeticona o a cualquiera de los componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6)
- Si tiene perforación u obstrucción intestinal conocida o sospechada.

Advertencias y Precauciones

Consulte a su médico si los síntomas empeoran o no mejora después de 10 días de tratamiento o si tiene estreñimiento prolongado. Lo mismo si se presentan cólicos acompañados de fiebre.

Toma de Flapex® Suspensión oral para gotas con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Dado que el paso de simeticona a sangre es insignificante, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia podrían tomar este medicamento después de consultar al médico.

Conducción y uso de máquinas

Flapex® Suspensión oral para gotas no tiene efectos conocidos sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

Flapex® Suspensión oral para gotas contiene metilparabeno y propilparabeno.
Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene metilparabeno y propilparabeno

3. ¿CÓMO TOMAR FLAPEX SUSPENSIÓN ORAL PARA GOTAS?

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda pregunte a su médico o farmacéutico.

Este medicamento se administra por vía oral.

Flapex® Suspensión oral para gotas puede administrarse solo o diluido en cualquier líquido.

Agite bien el envase antes de usar.

Niños de 2 a 12 años: 34 gotas por vía oral cuatro veces al día

Niños y bebés menores de dos años 17 a 34 gotas por vía oral cuatro veces al día

47 gotas equivalen a 1ml que contiene 40 mg de simeticona

Si toma más Flapex Suspensión oral para gotas

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a un centro médico, consulte a su médico o químico farmacéutico, indicando el medicamento y cantidad ingerida.

Si olvidó tomar Flapex Suspensión oral para gotas

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico ó farmacéutico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Durante el periodo de utilización de simeticona, se han notificado los siguientes efectos adversos de frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):

- estreñimiento transitorio moderado y náuseas.
- reacciones alérgicas (de hipersensibilidad) tales como erupción, picor en la piel, hinchazón de la cara o la lengua o dificultad para respirar.

Pueden producirse eructos que constituyen el mecanismo normal de eliminación de los gases con este tratamiento.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Mediante la comunicación de efectos

adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. CONSERVACIÓN DE FLAPEX SUSPENSIÓN ORAL PARA GOTAS

Conservar a temperatura no mayor a 25°C

Mantener fuera del alcance de los niños.

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

6.1. Lista de excipientes

Cada 100 mL de suspensión oral para gotas contiene:

Simeticona 4 g

Excipientes c.s : Sorbitol, Silicato de aluminio y magnesio, Carboximetilcelulosa sódica, Polisorbato 80, Metilparabeno, Propilparabeno, Ácido cítrico, Agua purificada.

Fabricante:

Fabricado por Tecnandina S.A.

Av. Manuel Córdova Galarza Km 6 ½, Quito – Ecuador

Importado por Laboratorios Andrómaco S.A.

Av. Quilín 5273 Peñalolén, Santiago.

Distribuido en Chile por Laboratorios Andrómaco S.A. Av. Quilín 5273, Peñalolén, Santiago y/o Novofarma Service S.A. Av. Victor Uribe N° 2280, Quilicura, Santiago.